



Gel vaginal con Ácido Láctico

Contribuye al Balance Natural
de la **flora vaginal**

Cómo actúa el gel con ácido láctico Gynofit

El gel con ácido láctico Gynofit contribuye al balance natural de la flora vaginal estabilizando el pH fisiológico de la vagina.

Uso terapéutico

Como tratamiento de corta duración en casos de vaginosis bacteriana o en combinación con antibióticos. Restablece el equilibrio de la flora vaginal y regula el pH.

Combate el picor, el ardor y el flujo vaginal de olor desagradable.


El gel Gynofit ha sido desarrollado en colaboración con ginecólogos para aliviar los signos de irritación vaginal.

Posología y modo de utilización


Gynofit es un gel intravaginal que se aplica por la noche, en posición acostada. Cada aplicador contiene una dosis de aplicación. El gel se introduce directamente en la vagina mediante el aplicador concebido especialmente para este fin, el cual se suministra en un envoltorio higiénico sellado.




1. Agite el tubo para que el contenido se deslice hacia la punta



2. Rompa la punta del tubo haciéndola girar



3. Introduzca el aplicador en la vagina



4. Presione totalmente el tubo para que todo el contenido penetre en la vagina

Efectos secundarios

Si el gel con ácido láctico Gynofit se utiliza siguiendo las indicaciones del fabricante, los efectos secundarios se limitan generalmente a una sensación de ardor o picor inicial reversible. En las personas con predisposición y, en particular, en presencia de una mucosa vaginal dañada por medidas de cuidado o de higiene o por medidas anticonceptivas locales inadecuadas, la aplicación del gel también puede irritar la mucosa vaginal. En estos casos, conviene interrumpir el tratamiento con el gel con ácido láctico Gynofit y no volver a utilizar el producto.

Contraindicaciones

No utilice el gel con ácido láctico Gynofit en caso de alergia conocida a alguno de sus componentes. Interrumpa inmediatamente el tratamiento y consulte a su médico en caso de reacción alérgica.

Uso

En el caso de síntomas de vaginosis bacteriana (secreción maloliente, escozor, prurito): De 6 a 12 días: aplicar cada día un aplicador preferentemente por las tardes, hasta que desaparezcan las molestias. Tras la menstruación / el acto sexual / la piscina, etc., aplicar también profilácticamente: de 1 a 2 aplicadores; un aplicador por la tarde.

Observaciones

Si los síntomas persisten a pesar de que el gel se aplica de acuerdo con las prescripciones, consulte a su médico o farmacéutico. Gynofit no contiene agentes espermicidas y, por tanto, no es apto como contraceptivo y no previene el riesgo de embarazo. El gel con ácido láctico Gynofit no contiene agentes conservantes ni perfume. Sin parabenos.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25 °C. Usar solamente una vez. Sin conservadores ni aromatizantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto higiénico para uso intravaginal.

Fecha de caducidad: Véase la fecha impresa en el envase.

Composición

Agua
Propilenglicol
Hidroxipropilmetilcelulosa
Ácido Láctico
Lactato de Sodio
Caprilil Glicol
Ácido Levulínico
Glucógeno
Glicerina
Levulinato de Sodio
Hidróxido de Sodio
Ácido Anísico

Fabricado en Suiza por:

Medena, AG

Industriestrasse 16, CH-8910, Affoltern am Albis, Suiza.

Para:

Tentan AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen, Suiza



Importado y acondicionado secundario en México por:

Ackerman Pharma, S.A. de C.V.

Cerrada Galeana No. 4, Col. La Loma,
C.P. 54060 Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México



Acondicionado secundario en México por:

Maquilas Tecnológicas en Empaques, S. de R.L. de C.V.
Calzada Ermita Iztapalapa No. 1551,
Colonia El Manto, C.P. 09830,
Iztapalapa, Ciudad de México, México.

Distribuido por:

GEDEON RICHTER MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Gustavo Baz Prada No. 109, Int. 113; Puerta 17.
Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México.



GEDEON RICHTER